



PROGRAMME REGIONAL DE PRODUCTION INTEGREE DU COTON EN AFRIQUE

Bénin, Burkina Faso, Côte d'Ivoire,
Mali, Sénégal et Togo

Tel/Fax : (226) 20 98 59 01/ 70 07 73 51

E-mail : prpica@yahoo.fr

Site Web : www.prpica.org

INFOS PR-PICA

BULLETIN D'INFORMATION
DU PR-PICA

N°29

Juillet 2020

SOMMAIRE

CAMPAGNE COTONNIERE 2020/2021 :

Pluviométrie de juillet 2020
P. 2

Emblavures (superficies)
au 31 juillet 2020 P. 3

Prix de cession des intrants
Insecticides et Herbicides
P. 3

Situation parasitaire au 31
juillet 2020 P. 4



CAMPAGNE COTONNIERE 2020/2021

**Superficies emblavées en baisse par
rapport aux prévisions dans la
plupart des pays du PR-PICA**

Bulletin d'information publié par le Secrétariat Exécutif du PR-PICA.

- **Président du PR-PICA** : M. Ousséni KABORE
- **Vice-Président** : M. N'Diamoi KODJANE
- **Rapporteur** : M. Luc ABADASSI
- **Secrétaire Exécutif** : M. Félix SAWADOGO

La pluviométrie du mois de juillet 2020 a été capricieuse dans la plupart des pays du PR-PICA avec une répartition mauvaise à moyenne des pluies. La mauvaise pluviométrie depuis le début de la campagne agricole a eu comme conséquence, la non-atteinte des prévisions d'emblavures dans l'ensemble des pays, exceptée la Côte d'Ivoire qui est à 102,7 %. D'autres contraintes, telles que le boycott de la campagne au Mali, a impacté négativement les emblavures dans ce pays avec seulement 21,6 % du taux de réalisation.

Les prix de cession des insecticides et des herbicides varient d'un pays à un autre. Cependant, par rapport à la campagne passée, ces prix sont soit au maintien ou en légère hausse.

La pression parasitaire au 31 juillet est dans l'ensemble faible dans la plupart des pays, avec quelques infestations moyennes par endroit de carpophages et de piqueurs suceurs sur les semis précoces. La vigilance est recommandée dans le suivi de ces ravageurs.

DONNEES PLUVIOMETRIQUES DU MOIS DE JUILLET 2020

Zonages Agroécologiques	Décade	Bénin		Burkina Faso		Côte d'Ivoire		Mali		Sénégal		Togo	
		nbre jrs	haut. (mm)	nbre jrs	haut. (mm)	nbre jrs	haut. (mm)	nbre jrs	haut. (mm)	nbre jrs	haut. (mm)	nbre jrs	haut. (mm)
Zone sèche/Nord	Décade 1	2	44,0	2	29,9	2	10	1	31	2	6	3	49,0
	Décade 2	4	15,4	5	134,1	4	199	5	169	6	92	5	78,8
	Décade 3	5	106,7	4	81,37	6	69,5	6	92	7	102	5	72,0
	Total	12	166,1	11	245,4	12	279	12	292	14	200	13	199,8
Zone médiane/Centre	Décade 1	4	68,1	3	45,8	3	28	2	13	1	20	3	48,7
	Décade 2	4	104,2	5	97,6	4	78,2	5	99	6	112	3	39,5
	Décade 3	2	44,1	4	108	4	81,6	5	110	6	117	4	57,6
	Total	10	216,4	11	251,4	11	187,8	12	222	14	249	10	145,8
Zone humide/Sud	Décade 1	2	54,4	4	57,4	1	30	2	47	2	24	2	25,5
	Décade 2	1	15,4	4	104,8	2	15	3	59	5	116	2	16,4
	Décade 3	2	23,8	3	48,7	5	146	8	125	7	108	2	28,5
	Total	5	93,6	10	210,9	8	191	13	231	13	248	6	70,3
MOYENNE JUILLET 2020		9	159	11	235,9	10	219,1	12	248,3	14	232,3	10	138,6
REPARTITION PLUVIOMETRIQUE		X		XX		XX		XX		XX		X	

X= Mauvaise répartition. XX : Moyenne répartition. XXX : Bonne répartition


Les quantités d'eau enregistrées montrent que le mois de juillet 2020 a été moyennement pluvieux dans l'ensemble des pays du PR-PICA, avec des hauteurs d'eau moyennes allant de 138,6 mm pour le Togo à 248,3 mm pour le Mali.

La répartition des pluies a été mauvaise au Bénin et au Togo ; moyenne au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire, au Mali et au Sénégal. Des difficultés pluviométriques ont été ainsi enregistrées dans la plupart des pays, perturbant le bon déroulement des semis du mois de juillet. C'est le cas du Bénin qui a connu de longues séquences sèches dans la zone Nord du pays.

Cette pluviométrie capricieuse dans la plupart des pays a compromis l'atteinte des prévisions d'emblavures de la campagne.

En comparaison avec la pluviométrie du mois de juillet de la campagne 2019/2020, il est noté une baisse des quantités d'eau pour ce mois de juillet 2020 au Togo (-101,9 mm) et au Mali (-14 mm). Cependant, une hausse des hauteurs d'eau a été enregistrée Burkina Faso (+51,4 mm), en Côte d'Ivoire (+101,1 mm) et au Sénégal (+88 mm).

Quant à la répartition des pluies de ce mois de juillet, elle a été dans la plupart des pays, mauvaise par rapport à celle de la campagne passée.



Pluviométrie du mois de juillet 2020 par rapport à celles des deux dernières campagnes

SUPERFICIES EMBLAVEES CAMPAGNE 2020/2021

	Bénin	Burkina Faso	Côte d'Ivoire	Mali	Sénégal	Togo
PREVISION CAMPAGNE 2020/2021 (ha)	700 000	675 605	433 000	810 000	25 000	190 000
TOTAL des emblavures au 31 juillet 2020 (ha)	610 559	579 998	444 705	174 666	18 366	118 180
Taux de réalisation au 31 juillet 2020/Prévision (%)	87,2	85,8	102,7	21,6	73,5	62
Taux de semis du mois de juillet 2020/Total des emblavures (%)	33	28	19	57	49	50

NB: Ces superficies au 31 juillet 2020 ne sont pas définitives et pourraient connaître des réajustements.

Les superficies emblavées au 31 juillet 2020 par rapport aux prévisions de la campagne varient d'un pays à un autre, avec des taux de réalisation allant de 21,6 % au Mali à 102,7 % en Côte d'Ivoire. Seule la Côte d'Ivoire a pu réaliser sa prévision de campagne.


Les difficultés pluviométriques (Bénin, Togo et Sénégal) conjuguées à certaines contraintes (Mali et Burkina Faso) n'ont pas permis aux pays d'atteindre leurs prévisions de campagne. Le faible taux de réalisation enregistré au Mali (21,6 %) est dû à un mouvement de boycott de la campagne par les producteurs, mécontents d'une part, de la baisse du prix d'achat coton graine et de la hausse des prix de cession des intrants, et d'autre part, des résultats de renouvellement des organes du réseau coopératif des producteurs de coton. Malgré la revue des prix en fin juin, cela n'a pas permis de rattraper le retard dans les emblavures.

Au Burkina Faso, l'insécurité dans la zone Est du pays a impacté négativement sur les emblavures de la zone avec seulement 60 % de réalisation par la Société SOCOMA. Cette situation a impacté le taux de réalisation national qui est de 85,8 %.

Pour le taux de semis du mois de juillet (assez tardif), il est supérieur ou égal à 50% au Mali et au Togo par rapport au total des emblavures.

Par rapport à la campagne passée 2019/2020, il est

noté au 31 juillet, une baisse des superficies au Mali (-602 583 ha), au Bénin (-84 651 ha), au Togo (-60 615 ha) et au Burkina Faso (-22 502 ha). Par contre une hausse des superficies emblavées a été enregistrée en Côte d'Ivoire (+21 854 ha) et au Sénégal (+1567 ha).



Superficies emblavées comparées : campagnes 2018/2019, 2019/2020 et 2020/2021

PRIX DE CESSION : INSECTICIDES ET HERBICIDES, CAMPAGNE 20/21

		Bénin	Burkina Faso	Côte d'Ivoire	Mali	Sénégal	Togo
Insecticides (FCFA/Ha/Traitement)		7000	3 800 (classiq) à 7 000 (Spécialité)	33 000 /6 passages soit 5500 /ha/tr	4240	4942	3000 à 4800
Herbicide (FCFA/L ou en FCFA/Ha)	Prélevée	5000 F/L (3 L/Ha)	5000 à 10690 F/Ha	5600 à 23400 F/Ha	6785 F/L	10656 F/Ha	5500 à 7300 F/L
	Post levé	7000 F/L (1 à 1,5 L/Ha)	8560 F/Ha	4590 à 8025 F/Ha	7860 F/L	6633 F/Ha	5500 F/L
	Total	3500 F/L (2 à 4 L/Ha)		3400 à 13 000/ha	3415 F/L		2200 F/L

SITUATION PARASITAIRE MOYENNE AU 31 JUILLET 2020

Ravageurs	Niveau d'infestation par pays						Observations
	Béni n	Burkina Faso	Côte d'Ivoire	Mali	Sénégal	Togo	
<i>H. armigera</i>	XX	X	X	X	X	X	Infestations moyennes observées au Bénin
<i>Earias spp</i>	XX		X	X	X	X	Infestations moyennes observées au Bénin et dans les zones de Bouaflé, Korokara, Goulia en Côte d'Ivoire.
<i>D. watersi</i>	X		X				Faible présence au Bénin et en Côte d'Ivoire
<i>T. leucotreta</i>	X						Faible présence observée au Bénin
<i>P. gossypiella</i>	X		X			X	Faible pression dans l'ensemble des pays.
<i>Bemisia tabaci</i>		X	X	X	X		Faible Infestation dans l'ensemble des pays, avec cependant des infestations moyennes en zone COIC en Côte d'Ivoire et dans certaines localités de la filiale sud au Mali.
Jassides	X	X	X	X	X	X	Faible infestation, dans l'ensemble des pays, mais moyenne dans certains secteurs comme Kounkané et Vélingara au Sénégal
<i>Dysdercus spp</i>	X	X	X	X			Faible présence dans l'ensemble des pays.
<i>A. gossypii</i>	XXX		X	X		XX	Fortes infestations observées au Bénin et moyennes au Togo et en zones SECO et CIDT en Côte d'Ivoire
<i>P. latus</i>	X		X				Faible pression au Bénin et en Côte d'Ivoire
<i>H. derogata</i>	XX	X	X			X	Infestations moyennes observées au Bénin
<i>A. flava</i>			X	X			Faible pression dans l'ensemble des pays.
<i>S. littoralis</i>			X	X			Faible pression dans l'ensemble des pays.
Virescence florale			X				Faible présence observée en Côte d'Ivoire
Fusariose			X				Faible présence observée en Côte d'Ivoire
Bactériose	X						Faible présence observée au Bénin
<i>S. frugiperda</i> (sur coton)	XX						Observée sur cotonnier au Bénin avec de moyennes infestations
<i>S. frugiperda</i> (sur maïs)	XXX	X	XX	XX		X	Observée sur le maïs dans la plupart des pays avec des attaques fortes à faibles.
Syagrus			X				Faible présence en Côte d'Ivoire, dans les zones qui ont utilisé de la poudrette de parc
Altises			X				Faible présence observée en Côte d'Ivoire sur la variété Gouassou
<i>Lygus spp</i>			X			X	Faible présence observée en Côte d'Ivoire et au Togo

X = Faible infestation ; XX = Moyenne infestation ; XXX = Forte Infestation

La pression parasitaire au mois de juillet 2020 a été relativement faible dans l'ensemble des pays, avec cependant des infestations moyennes de *H. armigera* et *Earias spp* observées au Bénin.

Quant aux piqueurs suceurs, c'est *Aphis gossypii* qui a été observé avec une infestation forte au Bénin et moyenne au Togo et en zones SECO et CIDT en Côte d'Ivoire

Le phyllophage *H. derogata* a été observé au Bénin avec une infestation moyenne.

La chenille légionnaire *Spodoptera frugiperda* s'est

signalée sur le coton avec des infestations moyennes au Bénin. Cependant **sur le maïs**, des infestations faibles à fortes ont été enregistrées dans l'ensemble des pays.

Pour une meilleure gestion de ces ravageurs, surtout avec les semis tardifs, nous recommandons :

- une surveillance accrue de ces ravageurs ;
- un respect strict du calendrier de traitement phytosanitaire établi ;
- une bonne transition entre les fenêtres de traitement phytosanitaire.

CÔTE D'IVOIRE : FIXATION DU PRIX D'ACHAT COTON GRAINE, CAMPAGNE 2020/2021

1^{er} Choix : 300 FCFA/Kg

2^{ème} Choix : 275 FCFA/Kg